




<b>Titre</b>	<b>Procédure pour visites de recherche à domicile pendant la pandémie de la Covid-19</b>
<b>Code</b>	<b>POL_DR03_V4</b>
<b>Mise en vigueur</b>	<b>6 août 2021</b>

<b>Rédacteur et vérificateur</b>	<b>Nom et titre des employés de l'établissement</b>		
Rédacteur	Nathalie Bureau, Cheffe des opérations recherche clinique		
Vérificateur	Julie Morin, Conseillère en gestion recherche clinique		
<b>Approbateur</b>			
<b>Nom</b>	<b>Titre</b>	<b>Signature</b>	<b>Date (JJ MMM AAAA)</b>
Jacques Michaud	Directeur de la recherche		<b>06 AUG 2021</b>



## 1 OBJECTIF

---

Le Centre de Recherche a développé des mesures spécifiques pour le déroulement des visites à domicile en contexte de recherche clinique en période de pandémie.

L'évolution positive de la pandémie Covid-19 (diminution importante des cas) a fait en sorte que la grande région de Montréal est passée de la zone rouge à la zone verte en juin 2021. C'est ajouté à cela le taux toujours croissant de vaccination de la population générale. Dans ce contexte, certains allègements sont désormais permis et ont un impact sur le déroulement des visites à domicile en contexte de recherche clinique.

**En date du 6 août 2021, les visites à domicile en contexte de recherche peuvent être reprises pour tous les types de projets sans restriction. Pour effectuer ces visites à domicile, il est fortement recommandé de privilégier du personnel de recherche pleinement vacciné (2 doses) contre le Covid-19.**

## 2 PORTÉE

---

Le document s'applique à tout le personnel de recherche clinique effectuant des visites de recherche à domicile.

## 3 RESPONSABILITÉS

---

Le Centre de Recherche est responsable de la mise à jour de cette politique selon l'évolution de la pandémie.

Le personnel de recherche clinique qui effectue les visites à domicile est responsable de suivre les consignes de cette politique.

## 4 PROCÉDURE DE VISITES À DOMICILE

---

1) Préviation de la visite :

- Appeler la famille 24h avant le rendez-vous;
- Confirmer avec eux, verbalement, qu'ils consentent à poursuivre leur participation à l'étude;
- Évaluer la présence des symptômes de Covid-19 et la présence d'un contact domiciliaire suspecté ou confirmé de Covid-19 en utilisant le questionnaire à jour, selon les directives institutionnelles (référence à l'annexe 1). Conserver le questionnaire complété au dossier de recherche du participant(e);
- Si la réponse à l'une des questions est oui, la visite doit être reportée à une date ultérieure c.-à-d. dès que les critères suivants sont rencontrés:
  - 14 jours depuis la date de début des symptômes ET
  - 24h sans symptôme ET
  - 48h sans fièvre sans prise d'antipyrétique



- Si la famille répond non à l'ensemble des questions, confirmer le rendez-vous pour la visite à domicile tel que prévu;
- Informer le patient qu'il doit recontacter l'équipe de recherche si l'enfant ou sa famille développe de nouveaux symptômes entre l'appel et la visite;
- Tout personnel de recherche qui se rend à domicile pour des visites de recherche doit avoir suivi la formation de base de la prévention des infections (chemin à suivre: intranet, onglet "Enseignement", dans "Centre du savoir" cliquer sur autoformations (e-learning), entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe, cliquer sur "Librairie de formations", sélectionner "Hygiène des mains en milieu de soins 2018" et cliquer au bas de la page sur "Ajouter des cours à votre plan de formation personnelle"). Retourner dans "Mes formations" et effectuer la formation en ligne qui dure 20 minutes. En complétant les questions à la fin de la formation, un certificat de formation sera émis;
- Dans la mesure du possible, privilégier d'envoyer du personnel de recherche pleinement vacciné pour effectuer les visites à domicile et éviter, lorsque c'est possible, les visites à 2 intervenants pour éviter de mettre les personnes en présence à risque. Si cela est tout de même jugé nécessaire, s'assurer que les équipements de protection sont à la disposition du personnel de recherche et qu'ils sont portés en respectant les directives;
- Le co-voiturage est permis lors des déplacements, mais les collègues de travail doivent porter leur masque en tout temps pendant les trajets.

2) Au moment de la visite à domicile, le personnel de recherche doit avoir en sa possession :

- Une bouteille de gel stérilisant pour l'hygiène des mains;
- Un masque de procédure;
- Une paire de lunettes réutilisable protectrice;
- Plusieurs paires de gants si soins directs au patient;
- Une blouse jetable non stérile à manche longue si soins directs au patient;
- Un paquet de lingettes désinfectantes.

3) Au moment de la visite à domicile, le personnel de recherche doit :

- Valider, dès son arrivée au domicile, l'absence de symptôme ou de cas de Covid-19 à la maison;
- Pratiquer l'hygiène des mains selon les normes du service de prévention des infections (voir formation);
- Doit porter un masque de procédure en tout temps pendant la visite à domicile. **Le port des lunettes de protection oculaire est toujours recommandé (paire de lunettes protectrices réutilisables) mais il est obligatoire seulement s'il y a des risques d'éclaboussures lors des soins prodigués;**



- Doit porter une blouse jetable non stérile à manche longue et des gants si soins directs aux patients (vaccin, prise de sang) et risque de souillures. Dans le contexte où des visites de recherche s'effectuent à domicile avec des participants qui sont en mesure de bien comprendre, de collaborer et de respecter les consignes de distanciation (ex. : adolescents, adultes), le port de la jaquette jetable n'est pas obligatoire;
- À la fin de ces visites, les mesures usuelles de prévention des infections doivent être appliquées (ex. : lavage des mains, enlever les vêtements de travail au retour à la maison, etc.);
- Maintenir 2 mètres de distance le plus possible en fonction des soins requis;
- Maintenir aussi 2 mètres de distance avec les autres membres de la famille;
- Apporter seulement le matériel et/ou équipement nécessaire lors de la visite;
- S'assurer que le matériel apporté à domicile soit dans un contenant ou sac de plastique ou autre matériel qu'il est possible de nettoyer avec une lingette désinfectante;
- Après la visite, désinfecter le matériel réutilisable avec une lingette désinfectante.

## 5 VERSION

---

<b>Versions</b>	<b>Changements</b>	<b>Date</b>
01	Version initiale	08 juin 2020
02	Modification suite à l'évolution de la pandémie	04 août 2020
03	Modification suite à l'évolution de la pandémie	02 octobre 2020
04	Assouplissements des précautions liées au Covid-19 suite à l'évolution de la pandémie	6 août 2021



## ANNEXE 1 : Questionnaire Covid-19

Questionnaire dépistage COVID-19 – Recherche clinique CHU Sainte-Justine À faire **24h avant la visite de recherche** et refaire l'évaluation des symptômes (question 5) **à l'arrivée au domicile du/de la participant(e)**

1) Avez-vous (parent ou enfant) reçu un diagnostic de COVID-19 (test de dépistage positif) dans les 3 derniers mois?  Oui  Non

Si **oui**, à quelle date? \_\_\_\_\_  
 S'il y a moins de 10 jours (ou moins de 21 jours pour un(e) participant(e) immunosupprimé(e)), le/la participant(e) ne peut se présenter au CHUSJ.

2) Avez-vous reçu une ou deux doses de vaccin?  Oui  Non

Si **oui**,  
 Date administration # 1 \_\_\_\_\_ Date administration # 2 \_\_\_\_\_  
 - - -20 -20

3) Avez-vous (parent ou enfant) été en contact avec quelqu'un ayant eu un diagnostic de COVID-19 dans les 14 derniers jours?  Oui  Non

➤ Si **oui** et n'a pas reçu ses **2 doses** de vaccin dans les 14 derniers jours (ou un test positif à la Covid + 1 dose de vaccin dans les 14 derniers jours), reporter la visite à domicile 14 jours après la date de contact.

4) Avez-vous (parent ou enfant) voyagé à l'extérieur du Canada dans les 14 derniers jours?  Oui  Non

Si **oui** et n'a pas reçu ses **2 doses** de vaccin dans les 14 derniers jours (ou un test positif à la Covid + 1 dose de vaccin dans les 14 derniers jours), reporter la visite à domicile 14 jours après la date de retour au Canada.

5) Est-ce que vous (parent ou enfant) présentez 1 des symptômes suivants :

- Fièvre ( $\geq 38,1^{\circ}\text{C}$  buccale)  Oui  Non
- Toux (nouvelle ou aggravée)  Oui  Non
- Écoulement nasal ou congestion nasale  Oui  Non
- Mal de gorge  Oui  Non
- Difficultés à respirer ou essoufflement  Oui  Non
- Perte soudaine de l'odorat ou du goût  Oui  Non

OU au moins 2 des symptômes suivants :

- Fatigue intense  Oui  Non
- Perte d'appétit importante  Oui  Non
- Douleur abdominale  Oui  Non
- Nausées ou vomissements  Oui  Non
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)  Oui  Non
- Mal de tête  Oui  Non
- Diarrhée  Oui  Non

Si **oui**, la visite à domicile devra être reportée jusqu'à ce que les critères suivants sont rencontrés:

- > 10 jours depuis la date de début des symptômes (maladie légère à modérée) ou > 21 jours (maladie sévère ou immunosupprimé) ET
- 24h sans symptômes (excluant toux, agueusie ou agueusie résiduelle) ET
- 48h sans fièvre sans prise d'antipyrétique.